



Yiyiniz içiniz ancak israf etmeyiniz (Araf 31)

Banu Atabay'ın lezzetler.com Yemek Tarifleri Sitesi

TRAKONYA

İBB Su Ürünleri Hali Müdürlüğü

Vücudu silindirik şeklinde ve uzundur.

Ağız normalden büyüktür. Alt çenesi yukarıya doğru çıkıktır. Çenelerindeki dişler küçüktür. Burnu çok kısadır. Basının yan taraflarında bulunan gözleri yukarıya doğrudur. Gözlerinin yan taraflarında ikiser, üçer adet dikenleri vardır. Bu dikenler solungaç kapaklarında da bulunur.

Solungaç kapaklarının kaidesinde ve sırt yüzgecinin ilk üç isinında zehirli bezler vardır.

Vücut rengi gri-kırmızı, sert tarafları kahverengi, sarı, karın tarafları ise gümüş beyazdır. Vücudun yan taraflarında ve karnında yukarıdan aşağıya ve önden geriye doğru siyah çizgiler bulunur. Basın yanlarında ve solungaç kapaklarında mavi çizgiler vardır.

Maksimum uzunluk 45 cm (Karadeniz'de ise 36 cm); ortalama uzunluk 10-30 cm (Karadeniz'de ise 15-20 cm). dir.

ÜREME DÖNEMİ : Üreme dönemi ilkbahar ve yaz aylarını kapsamaktadır. 3 yaşında eseyssel olgunluğa ulaşan bu balıkların yumurta verimliliği 20.000 dolaylarındadır.

TÜKETİM ŞEKLİ: Bu balıkların etleri gevrek, beyaz ve lezzetlidir. Az avlanmalarındandolayı yerel ve tamamen taze olarak pazarlanır. Ülkemizde ilgi görmeyen bu balık dış ülkelerde ekonomik değeri yüksek olan balıklardandır.

ÖNEMLİ BİLGİ : Bu balıkların dikenli sırt yüzgeçlerinden baska, operkulumları üzerindeki geriye doğru uzanmış bulunan dikenleri, viper türü zehirli yılanlarınkine benzer güçlü bir nörotoksik zehir taşımaktadır. Balık öldükten sonra de bu zehiri taşımaktadır. Dikenlerini batırdıklarında şiddetli ağrılı ödem ve yaralar ve nöromüsküler blokaj, kardiyovasküler ve solunum deprasyonlarına yol açarlar. Yaralar üzerine balıkların etlerinin kesilip konulması ve yılan zehirlenmelerinde olduğu gibi yaraların emilip, zehirin bir kısmının dışarı alınması ve bölgenin potasyum permanganatlı suyla ya da amonyakla yıkanması önerilmektedir. Sayet o anda amonyak yok ise üç-dört adet kibrit ucu ıslatılıp iğnenin battığı yere sürülebilir. Ancak bu tür önlem geçici olduğu için zehire maruz kalan kişi en kısa zamanda karaya çıkarılıp bir doktora veya hastaneye götürülmelidir. İlk tedavi yapılmadığı takdirde balığın vurduğu kişi büyük acılar içinde kıvrılır, zehir vücuda yayılır, vurduğu yerdeki hücreleri öldürüp sinirleri zedeleyerek eli, kolu veya bacağı sakat bırakabilir. Kalbi zayıf olan kişilerin bu konuda son derece dikkatli olmaları şarttır.

